



Син јазик

Што е син јазик?

Син јазик е вирусно заболување кај домашните и дивите преживари (овци, кози и говеда).

Луѓето не заболуваат.

Болеста во најтешка форма се јавува кај овците кај кои што предизвикува намалување на телесната тежина, нарушување во растот на волната и смрт.

Смртноста се движи од 2-30%.



Како се пренесува?

Синиот јазик се пренесува единствено преку каснување од инсекти (мушички) од видот *Culicoides*, во периодот на нивна активност (април-ноември), особено во топлите и влажни/дождливи периоди од годината.

Болеста не се пренесува од животно на животно, преку контакт, ниту преку консумација на млеко.

Болеста се јавува во подрачја каде што се присутни инсектите и каде што владеат поволни услови за нивно преживување во текот на зимата.

Како да се препознае болеста/знаци на болеста?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Треска - Крвен подлив и ранички во устата и носот - Лигавење и исцедок од носот - Оток на усните, јазикот и вилицата - Кривење и отежнато движење - Слабост, депресија и слабеење | <ul style="list-style-type: none"> - Пролив повраќање и пнеумонија - Абортус/пометнување - Пореметување во растот на волната кај животните кои ќе ја прележат болеста што може да доведе до делумно или целосно паѓање на волната - Сино обојување на јазикот (поретко се јавува) |
|--|---|



Доколку забележите некој од горенаведените симптоми веднаш пријавете кај Вашиот матичен ветеринар или кај ветеринарниот инспектор!

Како да се спречи појавата на син јазик

Контрола на инсектите

- Отстранете ги местата погодни за размножување на инсектите: застојана вода во бари, буриња и слично
- Отстранете/исчистете ја органската материја со која се хранат инсектите во и околу објектите, трлата (ѓубре од животинско потекло, отпадоци од храна, друг вид на ѓубре)
- Исчистете ги и извршете дезинсекција на просториите каде што се чуваат животните
- Поставете мрежи на отворите на шталите (влез, излез, прозорци и отвори за вентилација)
- Поставете мамки/стапици за уништување на инсектите



Контрола на животните

- Затварајте ги животните во објектите во периодот кога инсектите се активни (самрак до зори)
- Употребувајте репеленти – средства кои се нанесуваат на животните за заштита од убои од инсекти
- Одвојте ги болните животни од стадото
- Не ги продавајте и не ги преместувајте болните животни.